

Sort	Typ *)	Förädlare	I sort-förteckningen	Rekommenderad odlingszon	Växttid dygn	Värmesumma	Strållängd cm	Liggsäd %	TKV g	HLV kg	Protein %	Falltal vid skörd	Avkastning på olika odlingszoner			Vinterutfällning, %	Växtsjukdomar, %		
													I	II	III		Snömögel	Brunrost	Sköldfläcksjuka
SU Alesi	H	Hybro		I-III	339	927,4	116	38	33	73,7	9,8	175	88	127	114	26	15,7	..	18,3
Reetta	P	Boreal	2009	I-III	339	926,3	136	32	31	74	11,0	182	94	99	98	14	14,7	20,0	19,4
Dańkowskie Agat	P	Danko	2015	I-III	339	928,8	123	28	35,1	72,9	10,7	188	5621=100	6019=100	5935=100	20	17,9	7,5	22,8
Brandie	H	NOS		I-III	339	930,2	125	52	36,1	75,5	10,8	200	98	109	111	22	14,1	0,5	14,2
SU Allawi	H	Hybro		I-III	339	928,6	117	29	39,4	74,5	9,9	208	125	114	122	22	20,0	9,4	16,3
KWS Magnifico	H	KWS		I-III	339	927,9	118	34	35,7	74,8	9,5	225	96	101	119	18	15,7	40,2	21,0
SU Cossani	H	Hybro	2019	I-III	339		113	12	36,2	74,4	9,9	217	121	112	116	14	13,0	13,5	16,8
SU Performer	H	Hybro	2017	I-III	339	931,2	117	35	36,0	74,5	9,3	237	133	116	124	17	12,8	..	16,9
KWS Bono	H	KWS		I-III	339	932,1	112	34	34,9	74,5	10,1	210	120	116	118	17	14,9	3,9	16,8
Evolo	H	KWS	2009	I-III	340	936,4	115	34	37,3	74,1	10,0	218	107	115	115	16	12,0	22,3	19,3
KWS Binntto	H	KWS	2018	I-III	340	936,3	109	20	36,0	71,8	10,0	219	136	113	118	18	13,2	4,9	13,5
Helltop	H	Mons	2012	I-III	340	942,5	120	16	37,7	75,5	11,0	175	86	107	97	28	22,8	..	19,7
Caspian	H	SW Lantm	2013	I-III	340	942,8	122	22	36,2	72,9	9,5	198	98	112	102	24	18,5	14,1	17,1
Brasetto	H	KWS	2013	I-III	340	944,3	119	20	38,7	73,9	10,0	198	100	97	120	25	15,8	..	19,6
Elvi	P	Jögeva	2001	I-III	340	948,7	140	29	36,2	73,3	12,1	150	78	94	72	37	42,5	..	14,8
KWS Livado	H	KWS	2018	I-III	340	943,9	117	29	34,5	73,9	10,3	214	127	119	116	17	12,6	0	10,3

\*) H = hybrid, P =populationssort